

## Immunoprofülakтика ekspertkomisjoni 10.06.2021 koosoleku päevakord ja otsused

### PÄEVAKORD

1. 12-17 aastaste COVID-19 vaksineerimine
2. COVID-19 vaktsiinide kombineerimine (Vaxzevria 2. doosi asendamine mRNA vaktsiiniga)
3. Muud küsimused

### OTSUSED JA ARUTELUDE TULEMUSED

**1. Kuna Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty ametliku ravimi omaduste kokkuvõtte järgi on vaktsiini kasutamine lubatud alates 12. eluaastast, siis võib COVID-19 vastast vaksineerimist ka sellele vanusrühmale võimaldada. Komisjon soovib jätkuvalt raske haigestumise vältimiseks peatähelepanu all hoida eelkõige vaksineerimata täisealist elanikkonda, eriti vanemaealiseid.**

COVID-19 vaksineerimise eesmärk on eelkõige raske haigestumise ennetamine. Lapsed ja noored põevad üldjuhul COVID-19 haigust kergelt, kuigi teatud juhtudel võib esineda ka raskemat haigestumist. Kindlasti võiksid end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaksineerida need 12-15 aastased, kelle raviarst seda nende tervises seisundist tulenevalt vajalikuks peab. Vaksineerimisel tuleb hinnata kasu ja riski suhet, arvestades, et üle 16-aastaste puhul on kliinilistest uuringutest rohkem ohutusandmeid. Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse komitee üldine hinnang oli, et Comirnaty kasutamisest saadav kasu on 12- kuni 15-aastastel lastel suurem kui kaasnevad ohud, iseäranis lastel, kes tervisliku seisundi tõttu võivad haigestuda raskekujulisse COVID-19 haigusesse.

Praegu avatud vaksineerimiskohtades alustatakse ettevalmistustöödega, et võimaldada hiljemalt juulikuust vaksineerimist alates 12. eluaastast. Alla 18-aastaste COVID-19 vastasel vaksineerimisel tuleb arvestada põhjalikuma nõustamisega.

Alaealiste COVID-19 vastaseks vaksineerimiseks nõusoleku küsimisel lähtutakse võlaõigusseadusest, mille kohaselt võib alaealist vaksineerida üksnes tema enda nõusolekul, kui ta on võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma (võlaõigusseadus, § 766 lg 4). Alaealise vaksineerimisel tuleb lähtuda õiguskantsleri kantselei koostatud juhiseist: <https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapsapatiendi%20teavitatud%20n%C3%B5usolek%20%28infoleht%29.pdf>

- Kui alaealine tuleb vaksineerimisele koos vanema(te)ga, siis võib eeldada, et nii alaealine kui tema vanem(ad) on vaksineerimisega nõus ning alaealise kaalutusvõimet hindama ei pea (vt juhise punkt 10);
- Kui alaealine tuleb vaksineerimisele üksi, siis peab TTO hindama tema kaalutusvõimet. Kui alaealine on TTO hinnangul võimeline poolt ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma, võib vaksineerimise läbi viia alaealise teavitatud nõusoleku alusel (isegi juhul, kui vanemad või seaduslik esindaja on vaksineerimise vastu).

2. Uuringud COVID-19 vaktsiinide kombineerimise osas on käimas. Esialgsetel andmetel võib kahedoosilise vaksineerimisskeemi puhul kahe erineva tootja vaktsiinide kasutamisel kujuneda hea immuunvastus, kuid võib esineda rohkem süstijärgseid kõrvaltoimeid.

14.06.2021

Parima kaitse COVID-19 haiguse vastu annab lõpetatud vaktsiinikuur. Vaatamata esialgsetele tulemustele kombineeritud skeemide kasutamisest, ei ole Eestis mRNA vaktsiinikoguste piiratuse tõttu lähiajal võimalik kombineeritud skeemi laiemalt kasutusele võtta. Üldjuhul tuleb vaktsiinikuur lõpetada sama vaktsiiniga, millega seda alustati. Inimestel, kellel on tekkinud Vaxzevria esimese doosi järgselt tõsised kõrvaltoimed või on teise doosi manustamine Vaxzevriaga arsti hinnangul muul põhjusel vastunäidustatud, ei tohiks jääda vaktsiinikuur lõpetamata. Arsti otsusel võib põhjendatud juhtudel Vaxzevriaga alustatud vaktsiinikuuri teise doosi teha mRNA vaktsiiniga, kui see on korralduslikult võimalik.